

Algoritmo de cribado de prediabetes y diabetes (I)

Cribado oportunista

A) Edad ≥ 45 años

B) Riesgo de Diabetes

GB plasma¹

< 110

110-125

> 125

HbA1c

< 6,5%


$\geq 6,5$

Prediabetes¹

Diabetes²

Repetir GB cada 4 años (A) o anualmente (B)

- Antecedentes familiares de primer grado
- HTA
- Dislipemia
- Esteatosis Hepática No-alcohólica
- Tratamientos hiperglucemiantes
- Diabetes Gestacional/ Macrosomias
- Glucemia Basal Alterada o Intolerancia a la glucosa previas
- Obesidad IMC > 30
- Etnias de riesgo
- Hiperandrogenismo funcional ovárico (S. Ovario poliquístico)




GB: Glucemia Basal. GBA: Glucemia Basal Alterada ; ITG: Intolerancia oral a la Glucosa ; TTOG: Test de Tolerancia Oral a la Glucosa

1. Repetir cada cuatro años si edad ≥ 45 años y GB < 110 mg/dl y cada año si prediabetes o riesgo de diabetes 2. confirmar en dos ocasiones

Algoritmo de cribado de prediabetes y diabetes (II)

Cribado en dos etapas



GB: Glucemia Basal. GBA: Glucemia Basal Alterada ; ITG: Intolerancia oral a la Glucosa ; TTOG: Test de Tolerancia Oral a la Glucosa
1. Repetir GB cada año si prediabetes o FINDRISC ≥ 15 2. confirmar en dos ocasiones